

Vaccin Infanrix-hexa™ (DCaT-HB-VPI-Hib)

Le vaccin Infanrix-hexa™ est offert dans le cadre du programme régulier de vaccination des enfants yukonnais.

Ce vaccin constitue le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B (VHB), la poliomyélite et l'*Haemophilus influenzae* de type b. Ces maladies peuvent être très graves et sont parfois mortelles. Lorsque vous faites vacciner votre enfant, vous contribuez aussi à protéger les autres.



Ce vaccin protège contre six maladies :

- Diphtérie
- Tétanos
- Coqueluche
- Hépatite B (VHB)
- Poliomyélite (VPI)
- *Haemophilus influenzae* type b (Hib).

La **diphtérie** peut causer de graves problèmes respiratoires, des défaillances cardiaques, et même la paralysie.

La **coqueluche** peut entraîner des complications comme une pneumonie, des convulsions, des lésions cérébrales et, dans de rares cas, la mort. La coqueluche peut provoquer une toux grave ou des quintes de toux prolongées causant de l'essoufflement. La toux peut durer plusieurs mois, et elle est plus fréquente la nuit.

Le **tétanos** est une maladie causée par des bactéries qui se trouvent principalement dans le sol. Si ces bactéries infectent une plaie ou une coupure, elles produisent des toxines (poison) qui provoquent des spasmes musculaires intenses et douloureux. Cette maladie peut être très grave si les muscles du système respiratoire sont affectés.

L'infection à ***Haemophilus influenzae* type b (Hib)** peut causer d'autres infections graves ou même mortelles, y compris la méningite (une infection de la membrane qui recouvre le cerveau) et la septicémie (une infection sanguine).

La **poliomyélite** peut entraîner la paralysie des bras ou des jambes et même la mort.

L'**hépatite B** peut causer des maladies graves et endommager le foie de façon permanente, ce qui peut mener à des maladies comme la cirrhose. L'hépatite B est aussi la principale cause du cancer du foie, qui peut être mortel.

Les enfants âgés de deux mois à sept ans qui n'ont reçu aucune autre dose du vaccin DCaT devraient recevoir le vaccin Infanrix-hexa™.

Ce vaccin consiste en une série de trois doses, ou piqûres. La première dose est administrée à l'âge de 2 mois, la deuxième, à 4 mois et la troisième, à 6 mois. Le vaccin est administré en même temps que les autres vaccins destinés aux enfants.

Effets indésirables possibles du vaccin

Les réactions les plus fréquentes peuvent inclure la sensibilité, une enflure et une rougeur à l'endroit de la piqûre. Certains enfants peuvent faire de la fièvre, être d'humeur maussade, ne pas avoir d'appétit ou avoir envie de dormir. Ces réactions sont faibles et ne durent généralement qu'un jour ou deux.

Il est important de rester sur place 15 minutes après l'administration de tout vaccin parce qu'il existe une possibilité, quoique extrêmement rare, de choc anaphylactique, une réaction allergique potentiellement fatale. Les complications peuvent inclure des éruptions cutanées, de la difficulté à respirer, une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Si cela se produit après votre départ de la clinique, composez le 911 ou le numéro des services d'urgence de votre localité. Cette réaction peut être traitée, et le risque qu'elle se produise est inférieur à un par million de vaccins administrés.

Pour soulager ces symptômes

Vous pouvez donner à l'enfant un médicament de type acétaminophène (Tylenol®) pour réduire la fièvre ou la douleur. Ne donnez pas d'aspirine (ASA ou acide acétylsalicylique) aux enfants, car ils risquent de contracter le syndrome de Reye.

Signalez toute réaction grave ou imprévue à l'infirmière en santé publique ou à votre médecin.

Qui ne devrait pas recevoir ce vaccin?

Discutez avec l'infirmière en santé publique ou votre médecin si votre enfant a déjà eu une réaction allergique grave lorsqu'il a reçu une dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B (VHB), la poliomyélite ou l'*Haemophilus influenzae* de type b, ou tout composant de ce vaccin, y compris la néomycine, la polymyxine B ou le latex.

Le vaccin ne devrait pas être administré aux enfants âgés de plus de sept ans.

Consultez votre fournisseur de soins de santé si les effets indésirables persistent après 48 heures. Pour de plus amples renseignements sur les vaccins, visitez le site :

www.hss.gov.yk.ca/fr/immunization_info.php

