



# Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH)



## Le virus du papillome humain PEUT causer :

- Verrues génitales (condylomes)
- Cancer du col de l'utérus

## Complications possibles :

- Transmission de l'infection
- Cancer invasif du col de l'utérus
- Décès

## Effets secondaires possibles du vaccin :

- Douleur au site d'injection (84 % des cas).
- Démangeaison, enflure ou rougeur autour du site d'injection (jusqu'à 25 % des cas).
- Maux de tête (jusqu'à 28 % des cas).
- Diarrhée, étourdissements, nausée, fièvre (jusqu'à 13 % des cas) dans les 15 jours suivant la vaccination.

## Pour soulager ces symptômes :

- Appliquer une compresse d'eau froide à l'endroit touché.
- Appliquer une compresse d'eau froide à l'endroit touché.
- Prendre un médicament qui soulage la douleur causée par les maux de tête (ex. acétaminophène).
- Prendre un médicament contre la fièvre (ex. acétaminophène) si la température est supérieure à 38,5 °C.

*Les réactions allergiques graves sont rares, se produisent généralement immédiatement après l'injection et peuvent être traitées par la personne qui administre le vaccin. Vous devriez demeurer sur place au moins 15 minutes après avoir reçu votre vaccin de sorte que la réaction allergique puisse être traitée, si elle se produit.*

## Pourquoi se faire vacciner contre le virus du papillome humain (VPH)?

Le VPH est une infection qui se transmet principalement par contact sexuel. Le vaccin en trois doses protège contre deux types de VPH à l'origine de 70 % des cas cancers du col utérin et deux types de VPH à l'origine de 90 % des cas de condylomes. Il est ESSENTIEL de recevoir les trois doses du vaccin.

**Consultez votre fournisseur de soins de santé si les effets indésirables persistent après 48 heures. Pour de plus amples renseignements sur les vaccins, visitez le site : <http://www.hss.gov.yk.ca/>**

août 2010 — Programme mis sur pied en novembre 2009.