

Calendrier de vaccination du Yukon



V A C C I N

Â G E	DCaT-HB-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), hépatite B, poliomyélite, Haemophilus influenzae de type b	DCaT-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, Haemophilus influenzae de type b	DCaT-VPI / dcaT-VPI Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite	Pneumocoque [‡] conjugué	Méningocoque C conjugué	RRO Rougeole, rubéole, oreillons	Varicelle	VPH Virus du papillome humain (filles seulement)	Tdca Tétanos, diphtérie, coqueluche (acellulaire)	Influenza
2 mois	✓			✓	✓					
4 mois	✓			✓	‡					
6 mois	✓			‡						✓*
12 mois				✓	✓	✓	✓			
18 mois		✓								
4-6 ans			✓			✓	✓			
6 ^e année	Généralement administré à l'école.				✓			✓**		
9 ^e année	Généralement administré à l'école.								✓	

‡ Les enfants ayant des troubles médicaux particuliers qui les exposent à un risque élevé de maladie devraient recevoir une dose supplémentaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec une infirmière à votre Centre de santé communautaire.

* De six mois à neuf ans : une seconde dose est requise après 4 semaines, lorsque votre enfant reçoit le vaccin pour la première fois.

** À partir de l'année scolaire 2010-2011, deux doses, dont une seconde dose six mois après la première, puis une troisième dose en 11^e année.

Les effets indésirables associés à la vaccination sont notamment : sensibilité accrue et rougeurs au site d'injection, humeur maussade, légère fièvre. Si votre enfant présente des symptômes plus graves, veuillez consulter votre médecin et signaler toute réaction grave aux infirmières du Centre de santé de votre localité.

Consultez votre fournisseur de soins de santé si les effets indésirables persistent après 48 heures.

février 2012