

Yukon Immunization Schedule

VACCINE											
AGE	DTaP-HB-IPV-Hib Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Hepatitis B, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus Influenzae type B	DTaP-IPV-Hib Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus Influenzae type B	DTaP-IPV/Tdap-IPV Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine	Rotavirus	Pneumococcal Conjugate	Meningococcal Conjugate	MMR Measles, Mumps, Rubella	Varicella Chicken Pox	HPV Human Papilloma Virus	Tdap Tetanus, Diphtheria, Acellular Pertussis	Influenza
2 months	✓			✓	✓	✓					
4 months	✓			✓	✓	~					
6 months	✓				~						✓*
12 months					✓	✓	✓	✓			
18 months		✓									
4–6 years			✓				✓	✓			
Grade 6	Usually administered in school								✓**		
Grade 9	Usually administered in school					✓***				✓	

June 2017

~ Children with specific medical conditions that place them at high risk of disease should receive an additional dose.

* Ages six months to nine years: a second dose required four weeks after first if receiving vaccine for the first time.

** Starting 2014/2015 school year two doses: second dose six months after first dose.

*** Meningococcal Quadrivalent vaccine, A, C, Y, W135

Common side effects of immunization include soreness and redness at the site of the injection, irritability, and/or mild fever. If your child experiences anything more severe, please contact your physician and report all severe reactions to one of the nurses at your local Health Centre.

For more information contact your community health centre to speak to a nurse.

Calendrier de vaccination du Yukon

VACCIN											
ÂGE	DCaT-HB-VPI-Hib Diphtérie, coqueluche (acellulaire), tétanos, hépatite B, poliomyélite, Haemophilus influenzae de type b	DCaT-VPI-Hib Diphtérie, coqueluche (acellulaire), tétanos, poliomyélite, Haemophilus influenzae de type b	DCaT-VPI/ dcaT-VPI Diphtérie, coqueluche (acellulaire), tétanos, poliomyélite	Rotavirus	Pneumocoque conjugué	Méningocoque conjugué	RRO Rougeole, rubéole, oreillons	Varicelle	VPH Virus du papillome humain	Tdca Tétanos, diphtérie, coqueluche (acellulaire)	Influenza
2 mois	✓			✓	✓	✓					
4 mois	✓			✓	✓	~					
6 mois	✓				~						✓*
12 mois					✓	✓	✓	✓			
18 mois		✓									
4-6 ans			✓				✓	✓			
6 ^e année	Généralement administré à l'école								✓**		
9 ^e année	Généralement administré à l'école					✓***				✓	

Juin 2017

- ~ Les enfants ayant des troubles de santé particuliers qui les exposent à un risque élevé de maladie devraient recevoir une dose supplémentaire.
- * De six mois à neuf ans : une seconde dose est requise après 4 semaines, lorsque votre enfant reçoit le vaccin pour la première fois.
- ** À partir de l'année scolaire 2014-2105, deux doses, dont une seconde dose six mois après la première.
- *** Vaccin quadrivalent contre le méningocoque des sérogroupes A, C, Y, W135.

Les effets indésirables associés à la vaccination sont notamment : sensibilité accrue et rougeurs au site d'injection, humeur maussade, légère fièvre. Si votre enfant présente des symptômes plus graves, veuillez consulter votre médecin et signaler toute réaction grave aux infirmières du Centre de santé de votre localité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec une infirmières à votre Centre de santé communautaire.